

COVID-19

Información sobre la vacunación



Updated 01-11-2021

Recibió este documento porque se le pondrá una **vacuna contra el COVID-19**.
Lea abajo y el documento adjunto para obtener más información sobre la vacuna.

Usted recibirá:

La _____ vacuna de Pfizer

La _____ vacuna de Moderna

Cómo se administra la vacuna

- La vacuna se administrará mediante una inyección en el brazo. Se necesitan dos dosis,
_____ **Pfizer: 17 a 25 días entre una y otra.**
_____ **Moderna: 24 a 32 días entre una y otra.**

Su segunda dosis se programó cuando hizo su primera cita, y es muy importante que regrese a este centro para la segunda dosis.

- **La cita para la segunda dosis está programada para:** _____

Qué esperar en cuanto a los efectos secundarios

- Es habitual tener efectos secundarios después de una vacuna. Significa que su sistema inmunológico está trabajando y produciendo anticuerpos. La mayoría de los efectos secundarios reportados con la vacuna de Pfizer y la de Moderna son leves y desaparecen rápidamente, en especial con medicamentos de venta libre para el dolor. Los efectos secundarios frecuentes y previsibles son dolor en el punto de inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor en los músculos y las articulaciones, fiebre y escalofríos.
- Si tiene efectos secundarios inesperados o que duran mucho, puede llamar a la línea de Mount Sinai especializada en reacciones a la vacuna contra el COVID-19, al **646-605-5749**.
- **Si tiene una reacción alérgica grave, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.**

Who should and should not receive the vaccine

- La vacuna de Pfizer está autorizada para su uso en personas mayores de 16 años y la vacuna de Moderna, para su uso en personas mayores de 18 años.
- Si está embarazada o amamantando, hable de la vacunación con su proveedor médico antes de recibir la vacuna.
- No se ponga la vacuna de Pfizer ni la de Moderna contra el COVID-19 si tuvo una reacción alérgica grave (es decir, anafilaxia) a alguna vacuna o a los componentes de esa vacuna. Si tiene historia de alergias graves a medicamentos, hable con su proveedor médico.