

# COVID-19 疫苗接種資訊



更新時間: 2021年1月8日

您收到這份文件,是因為您符合接種 **COVID-19 疫苗**的資格。請閱讀以下內容及所附文件,以了解關於疫苗的更多資訊。

您所接受的是:

- \_\_\_\_\_ Pfizer 疫苗
- \_\_\_\_\_ Moderna 疫苗

## 接種疫苗的方式

- 疫苗將以注射的方式注入您的手臂。需要注射兩劑，
  - \_\_\_\_\_ Pfizer: 間隔 17 至 25 天。
  - \_\_\_\_\_ Moderna: 間隔 24 至 32 天。

您將在第一次接種時安排您的第二次接種,您必須返回本站點進行第二次接種,這一點非常重要。

- 您所預約的第二劑接種時間為: \_\_\_\_\_

## 關於副作用的須知事項

- 接種疫苗後出現副作用是常見現象。這意味著您的免疫系統正在運作並產生抗體。據報導, Pfizer 和 Moderna 疫苗的副作用大多數都很輕微且消失快,特別是在使用非處方止痛藥之後尤為顯著。可預期的常見副作用包括: 注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉和關節疼痛、發燒和發冷。
- 如果出現預期外或持續時間較長的副作用,您可以撥打 Mount Sinai COVID-19 疫苗反應熱線: **646-605-5749**。
- 如有嚴重的過敏反應,請撥打 **911** 或前往就近的急診室。

## 適合接種疫苗的人群

- Pfizer 疫苗僅授權給 16 歲以上的人群使用, Moderna 疫苗僅授權給 18 歲以上的人群使用。
- 如果您處於懷孕或哺乳期,請在接種疫苗前就接種問題諮詢您的醫療保健提供者。
- 如果您對疫苗或該疫苗的成分有過嚴重的過敏反應(例如過敏性休克),您不應該接種 Pfizer 或 Moderna 的 COVID-19 疫苗。如果您有嚴重的藥物過敏史,請諮詢您的醫護人員。